

រោគក្អកមាត់
(Pertussis or Whooping Cough)

រដូវត្រជាក់ច្រើននាំមកនូវបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនដល់មនុស្សយើង តាំងពីក្មេងតូចៗ ដល់អស់លោកចាស់ទុំ។ បញ្ហាសុខភាពទាំងនេះមានដូចជា គ្រុនក្តៅ គ្រុនផ្តាសាយធម្មតា, គ្រុនផ្តាសាយធំ, ក្អក, រលាកទងស្មុត, ហើមស្មុត ឬក្អកមាត់ជាដើម។

រោគក្អកមាត់ដែលពាក្យអង់គ្លេសហៅថា Whooping Cough ឬ Pertussis ជារោគក្អកម្យ៉ាងដែលឆ្លង យ៉ាងខ្លាំងដោយសារមេរោគបាក់តេរី។ រោគនេះ ច្រើនកើតមានជាមធ្យម ចំពោះក្មេងជំទង់និងមនុស្សពេញវ័យ តែចំពោះក្មេងតូចៗវិញ វាអាចមានលក្ខណៈយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។

រោគក្អកមាត់អាចមានរយៈពេលបីវគ្គ។ វគ្គទីមួយ គឺកើតឡើងដោយធ្វើឲ្យអ្នកជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយ, ហៀរសំបោរ, កណ្តាស់, និងក្អក។ ការក្អកនេះអាចមានរយៈពេលប្រហែលជាពីរ មួយអាទិត្យទៅពីរអាទិត្យ បន្ទាប់មក វាធ្វើឲ្យអ្នកជម្ងឺមានលក្ខណៈកាន់តែដុះដាលឡើង។ វគ្គទីពីរ គឺធ្វើឲ្យអ្នកជម្ងឺ ក្អកយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ពុំអាចទប់ទល់បាន។ បន្ទាប់មក មានធ្វើឲ្យក្អក ហើយធ្វើឲ្យអ្នកជម្ងឺអ្នកដកដង្ហើមម្តងៗ ឮសូរសម្លេងដង្ហក់យ៉ាងខ្លាំង។ នៅពេលក្អកខ្លាំងម្តងៗ វាអាចធ្វើឲ្យស្ទុះដង្ហើម ដែលជាហេតុបណ្តាលឲ្យមុខអ្នកជម្ងឺឡើងពណ៌ស្វាយស្លាំង ពីព្រោះដោយសារ ពុំមានខ្យល់ខកស៊ីហ្វែរនសំរាប់ដកដង្ហើមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់។ នៅពេល ឈប់ក្អកម្តងៗ អ្នកជម្ងឺនោះមើលទៅដូចមនុស្សជាធម្មតា។ រយៈពេលនេះ គឺអាចមាន ប្រហែលជាពីរ ២ អាទិត្យ ទៅ ៦ អាទិត្យ។ វគ្គទីបី គឺនៅពេលដែលអាការៈទាំងប៉ុន្មានដែល ខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកនេះចាប់ចុះអស់ថយបន្តិចទៅ វិញ។ ក្នុងលក្ខណៈនេះ អ្នកជម្ងឺប្រហែលជាអាចនៅមានក្អក ដង្ហក់ម្តងៗ តែចាប់ផ្តើមមានសភាពគ្រាន់បើជាងមុន។ ជាទូទៅ ក្អកមាត់ច្រើនមានរយៈពេលពី ៦ អាទិត្យ ទៅ ១០ អាទិត្យ។

ចំពោះមនុស្សពេញវ័យ, ក្មេងជំទង់, ឬក្មេងតូចៗ ដែលបាន ចាក់ថ្នាំការពាររោគនេះ រួចហើយ ច្រើនមានរោគសញ្ញាជាមធ្យម គឺមាន សញ្ញាដូចជាកើតរោគរលាកទងស្មុត (Bronchitis) ឬរោគក្អកធម្មតា។

មេរោគដែលបណ្តាលឲ្យកើតរោគក្អកមាត់ច្រើនមាននៅក្នុងច្រមុះ, មាត់, និងបំពង់ករ។ នៅពេលដែលអ្នកជម្ងឺនោះចាប់ កណ្តាស់, ក្អក, ឬហារមាត់និយាយ មេរោគទាំងនោះអាចហើរចេញទៅតាមខ្យល់អាកាស។ អ្នកដែលនៅជិតខាងនោះ អាចដកដង្ហើមនាំយក មេរោគទាំងនោះចូល

ទៅក្នុងស្ថិតជាមួយផង។ ម្យ៉ាងទៀតការប៉ះក្រដាស Kleenex ជួតសំបោររបស់អ្នកជម្ងឺ ឬ ប្រើ កែវទឹកជាមួយអ្នកជម្ងឺ ក៏អាចធ្វើឲ្យឆ្លងមេរោគក្នុងកម្រិតមធ្យមនេះបានដែរ។ សញ្ញាឬអាការៈរោគមុន ដំបូងបង្អស់ ដែលអាចឲ្យយើងដឹងថា អ្នកជម្ងឺឆ្លងរោគ គឺក្នុងរយៈពេលពី 7 ទៅ 10 ថ្ងៃ បន្ទាប់ ពីពេលដែលអ្នកជម្ងឺប៉ះពាល់នឹងមេរោគក្នុងកម្រិត។ អ្នកជម្ងឺអាចចម្លងរោគទៅអ្នកដទៃបាន ក្នុងរយៈពេលពី 2 អាទិត្យ មុនពេលដែលខ្លួនចាប់ផ្តើមក្អកជាដំបូង និង 3 អាទិត្យបន្ទាប់ពីចាប់ ក្អក ហើយ ឬរហូតដល់ពេលណា ដែលអ្នកនោះចាប់លេបថ្នាំផ្សះ (Antibiotic) បានចំនួន 5 ថ្ងៃ។

នៅក្នុងរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត រោគក្នុងកម្រិតច្រើនមាន ចំពោះមនុស្សដែលមានអាយុ ពីអាយុ 10 -20 ឆ្នាំ គឺ ជារយៈពេលអស់ជាតិថ្នាំការពាររោគ ដែលខ្លួនបានចាក់កាលនៅពីតូច។ បន្ទាប់មក គឺទារកតូចៗ ពីព្រោះទារកទាំងនោះ នៅតូចពេកថ្នាំបង្ការរោគពុំទាន់មានប្រសិទ្ធភាពការពារ។ ប្រសិនបើនិយាយឲ្យចំទៅ នរណាក៏អាចកើតរោគនេះបានដែរ ហើយវាអាចធ្វើឲ្យពិបាកចាប់ភ្លឹក ណាស់ ពីព្រោះអាការៈរោគនេះ មានលក្ខណៈ ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ទៅនឹងអាការៈរោគគ្រុនផ្តា សាយធម្មតា ហើយមានក្អក មិនឈប់ឈរអស់រយៈពេលរាប់អាទិត្យ ឬរាប់ខែ។

រោគក្នុងកម្រិតអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាពិបាកដកដង្ហើម, ហើមសួត, និងហើមស្រោមខ្លួនក្បាល ហើយ អាចបណ្តាលឲ្យកើតរោគស្តង់ប្រកាច់ ឬខូចខ្លួនក្បាល។ រោគនេះអាច បណ្តាលឲ្យអ្នកជម្ងឺស្លាប់ បាត់បង់ជីវិតបាន ជាពិសេសចំពោះទារកតូចៗ ប៉ុន្តែវាក៏ម្រមានណាស់។ ចំពោះក្មេងធំៗ, ក្មេង ជំទង់, និងមនុស្សពេញវ័យវិញ រោគនេះអាចមានលក្ខណៈស្រាលជាមធ្យម តែវាអាចធ្វើឲ្យអ្នក ជម្ងឺឈឺ អស់រយៈពេលរាប់អាទិត្យ ឬរាប់ខែ។

វេជ្ជបណ្ឌិតអាចប៉ាន់ស្មានបានថា អ្នកជម្ងឺកើតរោគក្នុងកម្រិតដោយសារ សញ្ញានៃរោគនេះ។ ប៉ុន្តែ ម្យ៉ាងទៀត មានតែការយកមេរោគ ឬឈាមទៅធ្វើតេស្តមើលទេ ទើបអាចដឹងពិតប្រាកដបាន។ វិធីយកមេរោគទៅពិនិត្យមើល គឺដោយសារការយកសំឡីក្បែកក្នុងច្រមុះ។ ឯការយកឈាម ទៅមើលវិញ គឺអាចធ្វើទៅបាន នៅពេលណាដែលអ្នកជម្ងឺនោះឈឺបាន ក្នុងរយៈពេលពីរឬបី អាទិត្យមកហើយ។

មធ្យោបាយសំខាន់ក្នុងការព្យាបាលរោគក្នុងកម្រិត គឺការសំរាក និងការទទួលទានទឹកឲ្យបាន គ្រប់គ្រាន់។ រីឯខ្យល់ខកស៊ីហ្វេរូន, ថ្នាំពេទ្យវិញក៏អាចជួយឲ្យអ្នកជម្ងឺអាចដកដង្ហើមបានស្រួល ដែរ។ ហើយថ្នាំសណ្តាំ (Sedative) វិញ អាចជួយឲ្យអ្នកជម្ងឺសំរាកបានស្រួល ដោយកុំឲ្យស្ងប់ក្អក ពេក។ ថ្នាំផ្សះអាចជួយបង្ក្រាបកុំឲ្យរោគមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លា ហើយកុំឲ្យអ្នកជម្ងឺចម្លងមេរោគ ទៅ អ្នកដទៃផង។ អ្នកដែលប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជម្ងឺក្នុងកម្រិត គួរអញ្ជើញទៅឲ្យគ្រូពេទ្យ ចេញសំបុត្រ

ទិញថ្នាំផ្សះ សំរាប់លេបការពាររោគ ទោះបីជាអ្នកនោះធ្លាប់ចាក់ថ្នាំការពារមកពីមុនមកហើយក៏ដោយ។

ក្មេងដែលមានអាយុតិចជាង 7 ឆ្នាំគួរទៅចាក់ថ្នាំការពារជម្ងឺ DTaP (Diphtheria, tetanus, acellular Pertussis) លើងលែងតែក្មេងនោះមាន ជម្ងឺអ្វីមួយដែលពុំអាចចាក់ថ្នាំនេះបាន។ មុនពេលចាក់ថ្នាំនេះឲ្យ គ្រូពេទ្យនឹងសាកសួរ ថាតើកូន លោកអ្នកធ្លាប់មានរោគស្តង់, ជម្ងឺខួរក្បាលផ្សេងៗ, ឬមានផលវិបត្តិបន្ទាប់ពីចាក់ថ្នាំ DTaP ពីមុនមកដែរឬទេ។ បើសិនជាគ្មានទេ លោកអ្នកគួរ យកកូនទៅចាក់ថ្នាំការពារជម្ងឺនេះ នៅពេល កូនមានអាយុ: 2 ខែ, 4 ខែ, 6 ខែ, ពី 12 -15 ខែ និងពី 4 - 6 ឆ្នាំ។

ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមស្តីអំពីរោគក្អកក្អង លោកអ្នកអាចសាកសួរ គ្រូពេទ្យប្រចាំគ្រួសារ, ក្រសួងសុខាភិបាលនៅតាមតំបន់លោកអ្នក ឬទូរស័ព្ទទៅក្រសួងសាធារណៈសុខាភិបាល នៃរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត កម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ ទូរស័ព្ទលេខ (617) 983-6800។ ប្រសិនបើ អស់លោក-លោកស្រី ពុំទាន់មានគ្រូពេទ្យប្រចាំគ្រួសារទេនោះ អស់លោក-លោកស្រីអាចអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅ មណ្ឌលមេត្តាសុខភាពនៃមណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍ក្រុងឡូវែលដែលមានទូរស័ព្ទលេខ (978) 441-1700 ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួប ជ្រើសរើសរកគ្រូពេទ្យប្រចាំគ្រួសាររបស់អស់លោក-លោកស្រី។

ព័ត៌មានទាំងនេះដកស្រង់និងបកប្រែចេញអំពីព័ត៌មាននៃក្រសួងសាធារណៈសុខាភិបាលនៃរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត ដោយមណ្ឌលមេត្តាសុខភាពនៃមណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍ក្រុងឡូវែល។